

2024年拟制修订的广东省中药饮片炮制规范品种目录

序号	品种名称	来源	炮制方法	提出单位
1	党参段	为桔梗科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.、素花党参 <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L. T. Shen或川党参 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv. 的干燥根的炮制加工品。	除去杂质，洗净，润透，切段，干燥。	广东省药品检验所
2	熟党参	为桔梗科植物党参 <i>Codonopsis pilosula</i> (Franch.) Nannf.、素花党参 <i>Codonopsis pilosula</i> Nannf. var. <i>modesta</i> (Nannf.) L. T. Shen或川党参 <i>Codonopsis tangshen</i> Oliv. 的干燥根的炮制加工品。	取净党参，蒸2小时至有香甜味时，取出，干燥。	广东省药品检验所
3	熟三七粉	为五加科植物三七 <i>Panax notoginseng</i> (Burk.) F. H. Chen的干燥根和根茎的炮制加工品。	取净三七，打碎，分大小块，用食油炸至表面呈棕黄色，取出，碾细粉。	广东省药品检验所
4	橘红花	为芸香科植物化州柚 <i>Citrus grandis</i> 'Tomentosa'的干燥花的炮制加工品。	除去杂质。	广东省药品检验所
5	石莲子	为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.的干燥成熟果实的炮制加工品。	除去杂质，用时捣碎。	广东省药品检验所
6				
7	全蛤蚧	为壁虎科动物蛤蚧 <i>Gekko gecko</i> Linnaeus的干燥体的炮制加工品。	用时除去鳞片及眼睛，切成小块。	广东省药品检验所
8				
9	四制艾叶	为菊科植物艾 <i>Artemisia argyi</i> Levl.et Vant.的干燥叶的炮制加工品。	取净艾叶，加入盐、醋、姜、酒混合液拌匀，吸尽后，蒸2小时，取出，晒干。	湛江市食品药品检验所
10	四制益母草	为唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.的干燥地上部分的炮制加工品。	取净益母草，用盐、醋、姜、酒混合液拌匀吸尽后，蒸2小时，取出，晒干。	湛江市食品药品检验所
11	醋益母草	为唇形科植物益母草 <i>Leonurus japonicus</i> Houtt.的干燥地上部分的炮制加工品。	取净益母草，用醋拌匀，渍一夜，取出，蒸1小时，干燥。	湛江市食品药品检验所
12	光皮木瓜	为蔷薇科植物木瓜 <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne的干燥成熟果实。的炮制加工品	除去杂质，洗净，稍润，蒸软，切片，干燥。	湛江市食品药品检验所

序号	品种名称	来源	炮制方法	提出单位
13	煨肉豆蔻	为肉豆蔻科植物肉豆蔻 <i>Myristica fragrans</i> Houtt.的干燥种仁的炮制加工品。	取净肉豆蔻，用湿草纸逐粒包裹3~4层，置炭火中，煨至纸烧焦，取出，去掉残纸及灰，摊凉；或用武火炒至外皮变黑，取出，摊凉。	湛江市食品药品检验所
14				
15	天冬 (段)	为百合科植物天冬 <i>Asparagus cochinchinensis</i> (Lour.) Merr.的干燥块根的炮制加工品。	除去杂质，迅速洗净，切段，干燥。	湛江市食品药品检验所
16	炒草果	为姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire的干燥成熟果实的炮制加工品。	取净草果，用文火炒至外皮焦黄色，并稍鼓起，取出，放凉，用时捣碎。	梅州市食品药品监督检验所
17	姜草果	为姜科植物草果 <i>Amomum tsao-ko</i> Crevost et Lemaire的干燥成熟果实的炮制加工品。	取净草果，用姜汁拌匀，闷润，待姜汁被吸尽后，用文火微炒，取出，摊凉。	梅州市食品药品监督检验所
18	益智	为姜科植物益智 <i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.的干燥成熟果实的炮制加工品。	除去杂质。	梅州市食品药品监督检验所
19	盐益智	为姜科植物益智 <i>Alpinia oxyphylla</i> Miq.的干燥成熟果实的炮制加工品。	取净益智，用盐水拌匀，闷润，待盐水被吸尽后，用文火（或置砂中）炒干，取出，摊凉（或筛去砂）。	梅州市食品药品监督检验所
20	炒扁豆	为豆科植物扁豆 <i>Dolichos lablab</i> L.的干燥成熟种子的炮制加工品。	将砂用武火炒至轻松，容易翻动时，投入净扁豆，炒至微黄色开裂具焦斑，取出，筛去砂，摊凉。	梅州市食品药品监督检验所
21	蜜桑白皮	为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥根皮的炮制加工品。	取净桑白皮，加入用适量酒稀释过的炼蜜，拌匀，待炼蜜被吸尽后，用文火炒至黄色，不粘手时，取出，摊凉。	梅州市食品药品监督检验所
22	梔子 (个)	为茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis的干燥成熟果实的炮制加工品。	除去杂质，用时捣碎。	中山市食品药品检验所
23	炒梔子 (个)	为茜草科植物梔子 <i>Gardenia jasminoides</i> Ellis的干燥成熟果实的炮制加工品。	取净梔子，用中火炒至黄褐色时，取出，摊凉。	中山市食品药品检验所
24	醋蒸香附	为莎草科植物莎草 <i>Cyperus rotundus</i> L.的干燥根茎的炮制加工品。	取净香附，用醋拌匀，闷润，待醋被吸尽后，蒸至透心，取出，干燥。	中山市食品药品检验所
25	炒狗脊	为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J.Sm.的干燥根茎的炮制加工品。	取净狗脊，用文火炒至微焦，取出，摊凉。	中山市食品药品检验所

序号	品种名称	来源	炮制方法	提出单位
26	酒狗脊	为蚌壳蕨科植物金毛狗脊 <i>Cibotium barometz</i> (L.) J.Sm.的干燥根茎的炮制加工品。	取净狗脊，用酒拌匀，待酒被吸尽后，蒸3小时，取出，晒干。	中山市食品药品检验所
27	盐莲须	为睡莲科植物莲 <i>Nelumbo nucifera</i> Gaertn.的干燥雄蕊的炮制加工品。	取净莲须，用盐水拌匀，略闷，待盐水被吸尽后，用文火炒至身干，呈深黄色时，取出，干燥。	中山市食品药品检验所
28	醋白薇	为萝藦科植物白薇 <i>Cynanchum atratum</i> Bge.或蔓生白薇 <i>Cynanchum versicolor</i> Bge.的干燥根和根茎的炮制加工品。	取净白薇，用醋拌匀，闷润，待醋被吸尽后，蒸至透心，取出，干燥。	江门市药品检验所
29	炒胡芦巴	为豆科植物胡芦巴 <i>Trigonella foenum-graecum</i> L.的干燥成熟种子的炮制加工品。	取净胡芦巴，用文火炒至熟透，取出，摊凉。	江门市药品检验所
30	盐桑椹	为桑科植物桑 <i>Morus alba</i> L.的干燥果穗的炮制加工品。	取净桑椹，用盐水拌匀，稍闷，待盐水被吸尽后，蒸2~3小时，取出，干燥。	江门市药品检验所
31	槐角炭	为豆科植物槐 <i>Sophora japonica</i> L.的干燥成熟果实的炮制加工品。	取净槐角，用武火炒至表面焦黑色，内部深黄色时，焗灭火星或喷洒清水，灭尽火星，取出，摊凉。	江门市药品检验所
32	煨诃子	为使君子科植物诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. 或绒毛诃子 <i>Terminalia chebula</i> Retz. var. <i>tomentella</i> Kurt. 的干燥成熟果实的炮制加工品。	取净诃子，用湿草纸逐个包裹3~4层，置炭火中煨至纸烧焦，取出，去掉残纸及灰，摊凉；或用武火炒至外皮松泡，取出，摊凉。	江门市药品检验所
33	(制)薏苡仁	为禾本科植物薏米 <i>Coix lacryma-jobi</i> L. var. <i>ma-yuen</i> (Roman.) Stapf的干燥成熟种仁的炮制加工品。	取净薏苡仁，用水润透，蒸2~3小时至熟透，取出，干燥，用中火炒至微黄色并膨胀，取出，摊凉。	江门市药品检验所